USO DA TELEMEDICINA EM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO COM LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM ÁREA RURAL DO AMAZONAS, BRASIL

Amanda Canto Duarte¹, Matheus Barroso Monteiro², Vitória Canto Duarte², Silmara Navarro Pennini³

¹Graduanda em Medicina da Universidade Nilton Lins, bolsista do Programa de Iniciação Científica da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas/ Fundação Alfredo da Matta

²Graduando em Medicina da Universidade Nilton Lins, colaborador do Programa de Iniciação Científica da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas/ Fundação Alfredo da Matta

³Dermatologista da Fundação Alfredo da Matta, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da Universidade do Estado do Amazonas e Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado

INTRODUÇÃO

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é doença endêmica no Brasil. Dos 17.772 registrados no país, em 2020, 8.305 (46,73%) foram da Região Norte.¹ Caracterizada pelo desenvolvimento de lesões ulceradas, únicas ou múltiplas, geralmente em áreas expostas da pele, podendo deixar cicatrizes, e graves deformidades, quando atinge a mucosa, levando ao preconceito². Na Amazonia, as grandes distâncias levam a população da área rural, que é a mais vulnerável à doença, a ter dificuldade a aderir ao tratamento padrão, realizado com medicamentos injetáveis e que necessitam cuidados quanto a toxicidade e/ou teratogenicidade. Durante a pandemia de Covid-19, a telessaúde passou a ser amplamente utilizada principalmente para consultas médicas nas diversas especialidades³. Este estudo avaliou a utilização de telessaúde na pesquisa, para o seguimento de pacientes alocados em ensaio clínico randomizado para LTA, em Manaus, capital do Estado do Amazonas, no período da pandemia.

Figura 3 - Área rural - Ramal do Pau Rosa

Figura 4 - Residências de áreas visitada em busca ativa de pacientes

METODOLOGIA

Estudo descritivo, de prevalência em três momentos (30, 90 e 180 dias) do seguimento dos pacientes alocados em um ensaio clínico randomizado para o tratamento da LTA. Foram avaliadas as características demográficas, clínicas e moradia dos pacientes do estudo, bem como a utilidade da telessaúde na pesquisa, por meio de aplicativo (Whats app) de *smartphones*, para a comunicação com os pacientes e recebimento de imagens clínicas visando resgatar os faltosos. Foi avaliada a qualidade e viabilidade das imagens enviadas pelos pacientes. O estudo foi realizado na Fundação Hospitalar de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (FUHAM) e na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), referências em dermatologia e infectologia, respectivamente. O estudo foi realizado no período de outubro/2020 a junho/2021 e faz parte de pesquisa aprovada pelo CEP-FUHAM sob número CAAE 36533620.3.1001.0002.

RESULTADOS

Foram alocados 49 pacientes no ensaio clínico cujos retornos estavam previstos para 30, 90 e 180 dias após o início do tratamento de 28 dias para o grupo experimento e 21 dias para o grupo controle. Foram 39 (80%) pacientes do sexo masculino e 10 (20%) do sexo feminino, com média de idade de 37,4 anos (desvio padrão 11,2). O extrativismo foi principal atividade relacionada a infecção, onde se incluem os agricultores, pecuaristas, trabalhadores de garimpo e extratores de madeira (Figura 1). Com relação à área provável de infecção, predominou a estrada AM 010, com seus os ramais aonde habitam os os pacientes (53%) (Figura 2).

Observou-se que 31 (63,26%) pacientes foram acompanhados por via remota, com o envio de fotos pelo WhatsApp, em algum momento do seguimento pós tratamento. A busca pelos pacientes que não compareceram a avaliação de 180 dias foi realizada via remota em 23 (47%) pacientes; dois (4%) pacientes estavam em sua residência durante a visita domiciliar e puderam ser avaliados; e não foi possível contactar três (7%) pacientes, apesar das várias tentativas, passando a serem perdas de seguimento (figuras 3, 4 e 5).

Figura 5 - Formas de retorno dos pacientes de Leishmaniose cutânea - Follow-up em ensaio clínico randomizado no Amazonas, 2021

CONCLUSÃO

O uso da tecnologia foi fundamental para se reduzir as perdas de seguimento no ensaio clínico com leishmaniose. Na figura 3 se observa o número decrescente de faltosos junto com o aumento das avaliações via virtual. Como observado por outros autores, foi evidente a boa qualidade das fotografias no sentido de permitir a avaliação clínica do processo de cicatrização das lesões e comparar com a imagem da lesão inicial feita pelo pesquisador (Figuras 6 e 7)⁴.

Figura 6 - Lesão característica de LTA, imagem feita pelo pesquisador antes do tratamento

Figura 7 - Imagem enviada pelo paciente, 90 dias após o tratamento

REFERÊNCIAS

- 1-Brasil. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. v-3.0.4.
- 2-Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de. Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar. Brasília: MS; 2017:189p.
- 3-Hadeler E, Hong J, Mosca M, Hakimi M, Brownstone N, Bhutani T et al. Perspectives on the Future Development of Mobile Applications for Dermatology Clinical Research. *Dermatol Ther.* 2021; 11: 1451-1456.
- 4-Jiang SW, Flynn MS, Kwock JT, Liu B, Quow K, Blanchard SK et al. Quality and perceived usefulness of patient-submitted store-and-forward teledermatology images. *JAMA Dermatol.* 2022 Jul 27:e222815. doi: 10.1001/jamadermatol.2022.2815. Epub ahead of print. PMID: 35895039; PMCID: PMC9330374.